

Полиомиелит. Что нужно знать родителям.

На сегодняшний день, благодаря всемирной кампании по ликвидации полиомиелита, в развитых странах заболевание встречается редко. Однако в марте 2021 года Всемирная организация здравоохранения заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане, было зарегистрировано четыре случая паралича у детей, инфицированных циркулирующим полиовирусом. Ситуация отнесена к чрезвычайной 2-го уровня сложности.

Главной задачей на сегодняшний день является донесение до людей необходимости профилактических, прежде всего иммунизационных мероприятий от полиомиелита.

Полиомиелит - это инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и может привести к параличу (обездвиживанию) и даже к смертельному исходу. Группой повышенного риска являются дети в возрасте до 5 лет. Вирус передается от человека человеку, в основном пути заражения ротовую полость с загрязнёнными руками, реже с пищей и водой. Симптомами полиомиелита являются: высокая температура, головные боли, тошнота, ригидность шеи и боли в конечностях.

Вакцинация является единственным эффективным способом защитить ребенка от полиомиелита. В рамках Национального календаря прививок используется два вида вакцин: инактивированная и пероральная. Вакцинация проводится в 3 и 4,5 месяца инактивированной вакциной, в 6 месяцев - живой оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ). В возрасте 18, 20 месяцев и 14 лет также проводится ревакцинация против полиомиелита живой вакциной.



Вакцинируя своего ребёнка вовремя, вы предупреждаете развитие полиомиелита и осложнений, связанных с ним.